

# 抗がん剤プロトコール<HER+XP>

診療科・主治医 \_\_\_\_\_

外来・入院( ) 患者ID \_\_\_\_\_ 患者氏名 \_\_\_\_\_ 性別 男・女 年齢 \_\_\_\_\_ 歳

病名 \_\_\_\_\_

身長 \_\_\_\_\_ cm 体重 \_\_\_\_\_ kg 体表面積 \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> HBs抗原 -・+

血清CRE \_\_\_\_\_ mg/dl CLCr \_\_\_\_\_ ml/min HER2 -・+( )

投与開始日 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 曜日 1クール21日 予定クール数 \_\_\_\_\_ クール

<処方内容> ゼローダ(1000mg/m<sup>2</sup>/回) \_\_\_\_\_ mg/日 ゼローダ300mg \_\_\_\_\_錠 分2朝夕食後

Day1夕からDay15朝まで14日間連日内服 7日間休薬

<ゼローダの用量>

体表面積	1回投与量		
	初回投与量	減量段階1	減量段階2
1.36m <sup>2</sup> 未満	1200mg(4錠)	900mg(3錠)	600mg(2錠)
1.36m <sup>2</sup> 以上1.41m <sup>2</sup> 未満	1500mg(5錠)		
1.41m <sup>2</sup> 以上1.51m <sup>2</sup> 未満		1200mg(4錠)	
1.51m <sup>2</sup> 以上1.66m <sup>2</sup> 未満			
1.66m <sup>2</sup> 以上1.81m <sup>2</sup> 未満	1800mg(6錠)	900mg(3錠)	
1.81m <sup>2</sup> 以上1.96m <sup>2</sup> 未満	2100mg(7錠)		
1.96m <sup>2</sup> 以上2.11m <sup>2</sup> 未満		1500mg(5錠)	
2.11m <sup>2</sup> 以上	1200mg(4錠)		

メインルート(シスプラチン投与前日から開始)

- [ : ] ①ソルデム1号500ml 6時間かけて ( ) サイン
- [ : ] ②ソルデム1号500ml 6時間かけて ( ) サイン
- [ : ] ③ソルデム1号500ml 2時間かけて ( ) サイン
- [ : ] ④ソルデム1号500ml 2時間かけて ( ) サイン

⑤初回  
生食250ml  
ハーセプチン(8mg/kg) \_\_\_\_\_ mg  
(ハーセプチン150mg V; 60mg V)  
(全量 ml) 90分かけて  
2回目以降  
生食250ml  
ハーセプチン(6mg/kg) \_\_\_\_\_ mg  
(ハーセプチン150mg V; 60mg V)  
(全量 ml) 30分かけて

- [ : ] ⑥生理食塩液100ml } サイン  
プロイメンド150mg 1V } ( )  
30分かけて
- [ : ] ⑦アロキシ0.75mg/バッグ50ml } サイン  
デキサート6.6mg 1.5V } ( )  
30分かけて

⑧生食1000ml  
シスプラチン(80mg/m<sup>2</sup>) \_\_\_\_\_ mg  
(シスプラチン25mg/50ml V; 10mg/20ml V)  
(全量 ml) 2時間かけて

- [ : ] ⑨ソルデム1号500ml 2時間かけて ( ) サイン
- [ : ] ⑩ソルデム1号500ml 2時間かけて ( ) サイン
- [ : ] ⑪ソルデム1号500ml 6時間かけて ( ) サイン
- [ : ] ⑫ソルデム1号500ml 6時間かけて ( ) サイン

シスプラチン腎機能障害時の投与量修正例  
(ゼローダ適正使用ガイドより)

Ccr > 60: 減量なし  
Ccr=51~59: 60mg/m<sup>2</sup>  
Ccr=41~50: 40mg/m<sup>2</sup>  
Ccr ≤ 40: 投与中止

ゼローダ腎機能障害時

(ゼローダ適正使用ガイドより)

Ccr ≤ 30: 投与禁忌

☆心疾患が疑われる又は胸・腹水がある時は  
過剰な水分にならないように注意する。

☆蓄尿 有

☆シスプラチン投与当日の1日尿量2000ml以下の時  
フロセミド1A iv.

☆シスプラチン投与翌日の1日尿量1500ml以下の時  
フロセミド1A iv.

☆悪心・嘔吐時  
生理食塩液100ml }  
デキサート6.6mg 1V } 30分かけて  
エリーテン10mg 1A }

[ : ] 側管①生食20ml }  
フロセミド20mg } iv.  
⑧開始10分後に開始 サイン( )  
(ロックシリンジ20ml 払い出し)

**【太枠内ケモセーフロック使用】**