

抗がん剤プロトコール < XELIRI + BV >

年 月 日

診療科・主治医 _____

外来・入院() 患者ID _____ 患者氏名 _____ 性別 男・女 年齢 _____ 歳

病名 _____

身長 _____ cm 体重 _____ kg 体表面積 _____ m² HBs抗原 一・十

血清CRE _____ mg/dl CLcr _____ ml/min

投与開始日 _____ 年 月 日 曜日 1クール 21日 予定クール数 _____ クール

<処方内容>

アバスチン 7.5mg/kg 30分～90分かけて
 イリノテカン 200mg/m² 90分かけて
 ゼローダ _____mg/日 ゼローダ 300mg _____錠 分2 朝夕食後


1日目に点滴静注(3週毎)

ゼローダ腎障害の目安と対処法
 (ゼローダ適正使用ガイドより)
 Ccr ≥ 51: 減量不要
 Ccr = 30 ~ 50: 75% 用量
 Ccr < 30: 投与禁忌

1日目夕から15日目朝まで14日間連日内服 7日間休薬

<ゼローダの用量>

体表面積	1回用量		
	開始用量	レベル-1	レベル-2
1.26m ² 未満	900mg(3錠)	600mg(2錠)	
1.26m ² 以上1.31m ² 未満			
1.31m ² 以上1.69m ² 未満	1,200mg(4錠)	900mg(3錠)	600mg(2錠)
1.69m ² 以上1.76m ² 未満	1,500mg(5錠)		
1.76m ² 以上1.88m ² 未満		1,200mg(4錠)	900mg(3錠)
1.88m ² 以上2.07m ² 未満			
2.07m ² 以上2.26m ² 未満	1,800mg(6錠)	1,500mg(5錠)	900mg(3錠)
2.26m ² 以上			



確認薬剤師

<下線部のみ記入して下さい。> <訂正箇所は赤字でお願いします。>