

抗がん剤プロトコル＜ XELOX+BV ＞

年 月 日

診療科・主治医

外来・入院() 患者ID 患者氏名 性別 男・女 年齢 歳

病名

身長 cm 体重 kg 体表面積 m² HBs抗原 ー・十

血清CRE mg/dl CLcr ml/min

投与開始日 年 月 日 曜日 1クール 21日 予定クール数 クール

＜処方内容＞

アバスチン 7.5mg/kg 30分～90分かけて } 1日目に点滴静注(3週毎)
オキサリプラチン 130mg/m² 120分かけて }

ゼローダ mg/日 ゼローダ 300mg 錠 分2 朝夕食後

1日目夕から15日目朝まで14日間連日内服 7日間休薬

＜ゼローダの用量＞

体表面積	1回用量
1.36m ² 未満	1,200mg(4錠)
1.36m ² 以上1.66m ² 未満	1,500mg(5錠)
1.66m ² 以上1.96m ² 未満	1,800mg(6錠)
1.96m ² 以上	2,100mg(7錠)

ゼローダ腎障害の目安と対処法
(ゼローダ適正使用ガイドより)
Ccr≥51:減量不要
Ccr=30～50:75%用量
Ccr<30:投与禁忌

年 月 日 曜日 XELOX+BV 投与スケジュール(クール目)

[:]

①グラニセトロン3mgバッグ100ml
デキサート6.6mg 1V
プロイメンド150mg 1V 30分かけて

サイン
()

↓

[:]

②生理食塩液100ml
アバスチン(7.5mg/kg) mg 1クール目90分かけて
(アバスチン400mg/16ml V; 100mg/4ml V) 2クール目60分かけて
(全量 ml) 3クール目以降30分かけて

サイン
()

↓

[:]

③5%ブドウ糖液250ml
オキサリプラチン(130mg/m²) mg
(エルプラット 100mg/20ml V; 50mg/10ml V)
(オキサリプラチン100mg/20ml V; 50mg/10ml V)
(全量 ml) 120分かけて

サイン
()

↓

[:]

④生理食塩液50ml 15分かけて

サイン
()

【太枠内ケモセーフ使用】

確認薬剤師

＜訂正箇所は赤字でお願いします＞
＜下線部のみ記入して下さい＞