

抗がん剤プロトコール＜ XELOX ＞

年 月 日

診療科・主治医 _____

外来・入院 () 患者ID _____ 患者氏名 _____ 性別 _____ 年齢 _____ 歳

病名 _____

身長 _____ cm 体重 _____ kg 体表面積 _____ m² HBs抗原 二・十

血清CRE _____ mg/dl CLcr _____ ml/min

投与開始日 _____ 年 月 日 曜日 1クール 21日 予定クール数 _____ クール

＜処方内容＞

エルプラット 130mg/m² 120分かけて 1日目に点滴静注(3週毎)

ゼローダ _____ mg/日 ゼローダ 300mg _____ 錠 分2 朝夕食後

1日目夕から15日目朝まで14日間連日内服 7日間休薬

＜ゼローダの用量＞

体表面積	1回用量
1.36m ² 未満	1,200mg(4錠)
1.36m ² 以上1.66m ² 未満	1,500mg (5錠)
1.66m ² 以上1.96m ² 未満	1,800mg (6錠)
1.96m ² 以上	2,100mg (7錠)

ゼローダ腎障害の目安と対処法
(ゼローダ適正使用ガイドより)
Ccr≥51:減量不要
Ccr=30~50:75%用量
Ccr<30:投与禁忌

[:]

①グラニセトロン3mg/バッグ100ml
デキサート6.6mg 1V
プロイメンド150mg 1V 30分かけて

サイン
()

↓

[:]

②5%ブドウ糖液250ml
オキサリプラチン(130mg/m²) _____ mg
(エルプラット 100mg/20ml V; 50mg/10ml V)
(オキサリプラチン100mg/20ml V; 50mg/10ml V)
(全量 ml) 120分かけて

サイン
()

↓

[:]

③生理食塩液50ml 15分かけて

サイン
()

【太枠内ケモセーフロック使用】

確認薬剤師

<訂正箇所は赤字でお願いします。>
<下線部のみ記入して下さい。>