

抗がん剤プロトコル<CBDCA+S-1>

年 月 日

診療科・主治医 _____

外来・入院() 患者ID _____ 患者氏名 _____ 性別 男・女 年齢 _____ 歳

病名 _____

身長 _____ cm 体重 _____ kg 体表面積 _____ m² HBs抗原 ー・十

血清CRE _____ mg/dl CLcr _____ ml/min

投与開始日 _____ 年 月 日 曜日 1クール 21日 予定クール数 _____ クール

<処方内容>

カルボプラチン 5AUC 60分かけて 1日目に点滴静注(3週毎)

TS-1(80mg/m²/日) _____ mg/日

TS-1(20 ・ 25)mg _____ 包 分2 14日間連日内服 7日間休薬

TS-1 DAY1 夕より服用開始

<TS-1投与量>

体表面積	TS-1投与量
1.25m ² 未満	40mg/回 x2/ day
1.25m ² 以上1.5m ² 未満	50mg/回 x2/ day
1.5m ² 以上	60mg/回 x2/ day

Calvertの式

投与量(mg/body) = AUC目標値(=5) × (eGFR+25)

年	月	日	曜日	CBDCA+S-1投与スケジュール(クール目)
[:]				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> ①グラニセトロン3mgバッグ100ml デキサート6.6mg 1V 30分かけて サイン () </div>
[:]				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> ② 5%ブドウ糖液250ml カルボプラチン(5 × (eGFR+25)) _____ mg (カルボプラチン450mg/45ml V; 150mg/15ml V) (50mg/5ml V) (全量 ml) 60分かけて サイン () </div>
[:]				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ③生理食塩液50ml 15分かけて サイン () </div>

【太枠内ケモセーフロック使用】

確認薬剤師

<訂正箇所は赤字でお願いします。>
<下線部のみ記入して下さい。>