

# 抗がん剤プロトコール＜CBDCA+VP-16+Atezolizumab＞

年 月 日

診療科・主治医

外来・入院( ) 患者ID 患者氏名 性別 男・女 年齢 歳

病名

身長 \_\_\_\_\_ cm 体重 \_\_\_\_\_ kg 体表面積 \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> HBs抗原 一・十 PD-L1 \_\_\_\_\_

血清CRE \_\_\_\_\_ mg/dl CLcr \_\_\_\_\_ ml/min DM 一・十 甲状腺機能異常 一・十

投与開始日 \_\_\_\_\_ 年 月 日 曜日 1クール 21日 クール数 4クール → 終了後テセントリク維持療法へ

## CBDCA+VP-16+Atezolizumab 投与スケジュール( \_\_\_\_\_ クール目)

Day1 _____ 年 月 日 曜日	Day2, 3 _____ 年 月 日 曜日
<p>[ : ]</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">                     ①★フィルター使用                      生理食塩液100ml                      テセントリク注 1200mg/20ml 1V                      (全量 120ml) 1クール目 60分かけて                      2クール目以降 30分かけて                 </div> <p style="text-align: right;">サイン ( )</p> <p>[ : ]</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">                     ②                      生理食塩液50ml                      15分かけて                 </div> <p style="text-align: right;">サイン ( )</p> <p>[ : ]</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">                     ③                      グラニセトロン3mgバッグ100ml                      デキサート6.6mg 1V                      プロイメンド150mg 1V                      30分かけて                 </div> <p style="text-align: right;">サイン ( )</p> <p>[ : ]</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">                     ④★フィルターなし使用                      5%ブドウ糖液500mL                      エトポシド(100mg/m<sup>2</sup>) _____ mg                      [エトポシド100mg/5ml _____ V]                      (全量 _____ ml) 90分かけて                 </div> <p style="text-align: right;">サイン ( )</p> <p>[ : ]</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">                     ⑤                      5%ブドウ糖液250ml                      カルボプラチン(5×(eGFR+25)) _____ mg                      [カルボプラチン450mg/45ml _____ V; 150mg/15ml _____ V]                      50mg/5ml _____ V                      (全量 _____ ml) 60分かけて                 </div> <p style="text-align: right;">サイン ( )</p> <p>[ : ]</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     ⑥                      生理食塩液50ml                      15分かけて                 </div> <p style="text-align: right;">サイン ( )</p>	<p>[ : ]</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">                     ①                      生理食塩液100ml                      デキサート6.6mg 1V                      30分かけて                 </div> <p style="text-align: right;">サイン ( )</p> <p>[ : ]</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">                     ②                      5%ブドウ糖液500mL                      エトポシド(100mg/m<sup>2</sup>) _____ mg                      [エトポシド100mg/5ml _____ V]                      (全量 _____ ml) 90分かけて                 </div> <p style="text-align: right;">サイン ( )</p> <p>[ : ]</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     ③                      生理食塩液100ml                      15分かけて                 </div> <p style="text-align: right;">サイン ( )</p>

【太枠内ケモセーフロック使用】

確認薬剤師

<訂正箇所は赤字でお願いします。>

<下線部のみ記入して下さい。>