

抗がん剤プロトコール<ジェブタナ療法>

作成日

<医師入力項目> 黄色に塗りつぶされている所を入力して下さい (入力すると黄色マーカーが消えます)

<基本情報>

患者ID				患者氏名			HBs抗原	
年齢	歳	性別		身長		cm	HBs抗体	
体表面積		m ²		体重		kg	HBc抗体	
Ccr		mL/min		アルコール過敏				

病名							
投与開始日	年	月	日	曜日	主治医		
1クール	21	日	予定クール数				

<処方内容>

プレドニン5mg 2T (分2) 朝昼食後 21日間 連日内服

<Day1>

①

グラニセトロン100mL
 デキサート6.6mg 1V
 ポララミン注5mg 1A
 ファモチジン注20mg 1A
 15分かけて

↓

②

生理食塩液50mL
 30分かけて

↓

③★フィルター使用

生理食塩液250mL
 ジェブタナ注 (25mg/m²) _____ mg
 計算上 0 mg (_____ %)
 (ジェブタナ60mg V)
 (全量 mL) 60分かけて

↓

※ジェブタナは添付溶解液全量で溶解
 溶解後濃度が10mg/mLとなるので必要量採取

↓

④

生理食塩液50mL
 15分かけて

<Day3>

①

ジーラスタ皮下注3.6mg
 皮下注

<参考> 調製例

カバジタキセル投与量	輸液バッグの容量
<25mg	100mL
25~65mg	250mL
>65mg	500mL

《薬剤部対応》
 ジェブタナ購入時にジーラスタも購入する

確認薬剤師

--	--

【太枠内ケモセーフ使用】
 <訂正箇所は赤字でお願いします>