

抗がん剤プロトコール

<キイトルーダ+レンビマ> 【腎細胞癌 進行再発】 作成日

<医師入力項目> 黄色に塗りつぶされている所を入力して下さい (入力すると黄色マーカーが消えます)

<基本情報>

患者ID				患者氏名				HBs抗原	
年齢	歳	性別		身長		cm	HBs抗体		
体表面積		m ²		体重		kg	HBc抗体		
Ccr				mL/min					

病名							
投与開始日	年	月	日	曜日	主治医		
1クール	21	日	予定クール数				

<処方内容>

レンビマ (レンバチニブメシル酸塩)

レンビマカプセル10mg 1回2Cap (開始量) 1日1回 21日間 連日内服

【太枠内ケモセーフ使用】

<訂正箇所は赤字でお願いします>

<Day1>

①★フィルター使用
生理食塩液100mL
キイトルーダ注 (200mg/body) $\frac{200}{100} \text{ mg}$ (100%)
(キイトルーダ100mg/4mL 2 V)
(全量 108 mL) 30分かけて

↓

② 生理食塩液100mL 全開で

確認薬剤師



--	--

<レンビマ注意点>

減量は以下の基準に従って行ってください。

	投与量	カプセル数
開始用量	1日1回 20mg	10mg×2
1段階減量	1日1回 14mg	10mg×1 4mg×1
2段階減量	1日1回 10mg	10mg×1
3段階減量	1日1回 8mg	4mg×2
4段階減量	1日1回 4mg	4mg×1

本剤は4段階の用量調節が可能であるため、含量の異なる2種類のカプセル剤の組み合わせによる飲み間違いが生じないように、特に用量調節を行った際には患者に十分に服薬指導を行ってください。



GradeはCTCAE (Common Terminology Criteria for Adverse Events) version 4.0に準じる。